

ESPÈCES MALGACHES DU GENRE PARACYLINDROMORPHUS
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR A. THÉRY,
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Dessus à pubescence claire, grossière, éparse, couchée dans les rides transversales des élytres, ceux-ci conjointement arrondis au sommet, mais sans angle sutural marqué..... 2

Dessus absolument glabre, angles postérieurs du pronotum très aigus, presque épineux, élytres isolément arrondis au sommet; taille plus grande..... 1. *albifrons*.

2. Bronzé, élytres près de deux fois 1/2 aussi longs que la tête et le pronotum réunis; pronotum impressionné transversalement à la base..... 2. *Waterloti* n. sp.

Noir, élytres un peu moins de deux fois aussi longs que la tête et le pronotum réunis; pronotum non impressionné transversalement à la base..... 3. *hova* n. sp.

1. **P. albifrons.** Théry, Bup. Madag. (1905), p. 141, pl. V, f. 28. — Long. 4^{mm},5; larg. 0^{mm},79, ♂, très allongé, noir, entièrement glabre, très brillant, ayant sa plus grande largeur au quart postérieur des élytres.

Tête très bombée, aussi large que le pronotum, ayant la forme d'un rectangle à angles arrondis et à bord antérieur sinué; couverte de petites impressions superficielles ocelliformes, largement sillonnée sur le front dont la moitié inférieure est couverte d'une grosse pubescence d'un blanc brillant, dirigée vers le bas; la bouche placée tout à fait en dessous de la tête; l'épistome échancré. Yeux ovales, obliques, divergents vers la hauteur, leur bord supérieur dépassant, vers le haut, la moitié de la hauteur de la tête; antennes avec les deux premiers articles très épais, le 2^e plus long que large, en forme d'olive courte, les 3 suivants piriformes et subégaux, les 6 derniers dentés, très épais, arrondis au sommet, le dernier en olive allongée et très rapproché de l'avant-dernier. Pronotum ayant sa plus grande largeur en avant, fortement

rétréci en arrière, et largement sinué avant les angles postérieurs qui sont très aigus; le bord antérieur largement bisinué, non rebordé, le postérieur profondément et largement bisinué avec un lobe médian anguleux, la carène latérale arquée en arrière, droite en avant et un peu atténuée avant le bord antérieur; carène supérieure marquée par un bourrelet arrondi, arqué, très rapproché de la carène latérale; disque subdéprimé, avec un large et profond sillon derrière le bord antérieur, limité en arrière par un bourrelet transversal, faiblement impressionné derrière ce bourrelet, dans les angles postérieurs et au-dessus des carènes supérieures; paraissant lisse et brillant, mais en réalité avec une microsculpture analogue à celle de la tête. Écusson lisse, brillant, en triangle très allongé. Élytres plus larges à la base que le pronotum, arrondis aux épaules, largement et assez profondément sinués, de ce point au quart postérieur, puis atténués en très faible courbe jusqu'au sommet où ils sont isolément arrondis et très finement denticulés, non rebordés latéralement; disque couvert d'ondulations peu profondes visibles seulement sous un certain angle et paraissant unies, vues perpendiculairement; sans traces de ponctuation, mais avec une sculpture microscopique répartie dans les parties enfoncées. Extrémité du pygidium testacée. Dessous avec quelques petits poils clairs. 1^{er} article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis, le dernier avec une lamelle. Les crochets épais et lobés à la base.

Habitat : Madagascar (GRANDIDIER).

P. Waterloti n. sp. — Longueur 3 millimètres; largeur 0^{mm},72. — ♂ — Allongé, bronzé, brillant, recouvert d'une pubescence blanche, longue et espacée; ayant sa plus grande largeur vers le tiers postérieur des élytres. Tête de la largeur du pronotum, renflée aux joues, atténuée vers l'avant, avec les yeux saillants, faiblement sinuée antérieurement, à pubescence espacée, à sculpture microscopique entremêlée de petits points brillants. Front sillonné dans sa longueur, couvert de longs poils ciréux transversalement appliqués sur sa surface, avec, au bord inférieur, une frange de poils dirigés vers la bouche (♂). Branches latérales de l'épistome prolongées en pointes, vers le bas, l'épistome surmonté de deux pores larges et profonds situés l'un près de l'autre contre l'insertion des antennes. Antennes atteignant le milieu de la longueur du pronotum, les articles de la base un peu aplatis en avant, le 2^e plus épais et presque aussi long que le 3^e, les articles dentés à lobe arrondi à l'extrémité. — Pronotum ayant sa plus grande largeur au bord antérieur, avec les côtés droits et convergents légèrement vers l'arrière, un peu arrondis avant les angles postérieurs qui sont un peu obtus; bord antérieur largement et peu profondément

bisinué, limité par un fin bandeau lisse séparé du disque par une fine strie; base très faiblement bisinuée, avec le lobe médian tronqué-sinué; rebordé latéralement par une carène tranchante presque droite, la carène supérieure assez éloignée de la carène latérale à laquelle elle est subparallèle depuis la base, elle est effacée à partir du tiers antérieur. Disque largement et semicirculairement déprimé à la base, à sculpture analogue à celle de la tête, mais plus distincte. Écusson en triangle à pointe postérieure très aiguë. Élytres ayant à l'épaule, à peu près la même largeur que le pronotum, mais avec leur rebord latéral un peu élargi ensuite; étranglés à hauteur des pattes postérieures, ayant leur plus grande largeur vers le tiers postérieur, puis atténués en faible courbe jusqu'au sommet où ils sont subconjointement arrondis, finement rebordés latéralement avec les épipleures distincts jusqu'au sommet, impressionnés le long de la base qui est relevée en un mince bourrelet, la suture finement rebordée sur la plus grande partie de sa longueur, le disque couvert, sauf au sommet, de rides transversales, obliques, bien nettes, allant d'un bord à l'autre, avec de gros poils clairs, isolés, couchés entre les rides. Sur le tiers postérieur, ces rides disparaissent complètement et le fond de l'élytre paraît granuleux. Dessous avec des points ocelliformes bien marqués et des poils blancs, très courts et rares. Angles postéro-externes des hanches postérieures très aigus et saillants. Dernier sternite abdominal entier. Crochets des tarsi simples.

Habitat : Madagascar, environs de Tananarive (Waterlot).
1 exemplaire.

P. hova n. sp. — Longueur 2^{mm},42; largeur 0^{mm},72. Court, d'un noir verdâtre, assez brillant, recouvert d'une pubescence blanche, courte, espacée, couchée entre les rides; ayant sa plus grande largeur au tiers postérieur des élytres, mais dépassant très peu, à ce point, la largeur de la tête.

Tête subglobulaire, de la largeur du pronotum, rétrécie à la base, renflée sur les côtés, atténuée en avant, avec le front légèrement sillonné, les yeux à peine saillants, la sculpture formée de très petites cicatrices arrondies régulièrement disposées sur un fond microscopiquement réticulé, comme dans la plupart des espèces du genre; front impressionné au milieu, parcouru, dans toute sa longueur, par une fine ligne de suture, saillante, très finement et éparsement pubescent, la pubescence disposée horizontalement; épistome faiblement échancré, à branches latérales courtes, séparé du front par une petite carène lamellaire mince, onduleuse. Yeux ovales, atténués dans le bas, à réticulation assez forte, obliques, leur sommet n'atteignant pas le niveau du milieu

de la hauteur du front. Antennes courtes, n'atteignant pas le bord antérieur du pronotum, le 2^e article distinctement emboîté dans le 1^{er}, les articles 3-5 subcylindriques et à peu près de longueur égale, les articles dentés épais, peu aigus, le dernier article en olive allongée. Pronotum ayant sa plus grande largeur près du bord antérieur, ses côtés faiblement arqués près des angles antérieurs, puis droits et convergents vers la base, avec les angles postérieurs faiblement obtus, le bord antérieur à peine bisinué et largement saillant au milieu, non rebordé; la base bisinuée avec le lobe médian subtronqué; rebordé latéralement par une carène tranchante, tout à fait droite et nullement atténuée en avant, la carène supérieure subparallèle à la précédente sur toute sa longueur et assez éloignée d'elle, est effacée à partir du quart antérieur; disque vaguement déprimé au milieu derrière le bord antérieur, mais sans sillon transversal; obliquement impressionné derrière la carène supérieure, à sculpture analogue à celle de la tête. Écusson relativement grand, plus large que long, arrondi au bord antérieur. Élytres ayant, à l'épaule, la même largeur que le pronotum, fortement sinués avant les hanches postérieures, très élargis au tiers postérieur puis atténués, presque en ligne droite, jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis; peu distinctement rebordés sur les côtés, mais avec les épipleures distincts presque jusqu'à l'apex; suture faiblement rebordée sur les 3/4 de sa longueur, la base impressionnée transversalement, le disque avec des fossettes disposées en séries transversales, formant quelques rides au milieu, les fossettes un peu effacées à l'apex. Extrémité du pygidium brunâtre.

Habitat : Madagascar, Centre-Sud. St. 61 (ALLUAUD, 1901).
1 exemplaire.